

VegOil

Mode d'emploi

Adjuvant et insecticide naturel à base d'huile de colza

■ Composition 875 g/l (94.6%) huile de colza, EC

■ Généralités

VeOil augmente le pouvoir mouillant des produits phytosanitaires et accroît donc leur efficacité. L'adjonction de VegOil est particulièrement recommandée en cas de mauvaises herbes fortement développées ou pour les graminées et adventices difficiles à imbiber.

En tant qu'insecticide, VegOil se dépose sous forme de film huileux à la surface des feuilles et sur les ravageurs, étouffant ceux-ci.

Au contraire de l'huile minérale, VegOil n'est pas irritantes et donc plus agréables d'emploi et se dégradent plus rapidement.

■ Emploi

Important: ne pas utiliser par température très élevée!

Arboriculture

2 % (32 lt/ha) contre lécanium du cornouiller; effet partiel: acarien rouge, cheimatobies, phytopte du poirier, pucerons du feuillage. Traitement au débourrement avec beaucoup d'eau (1500-2000 l/ha). Afin d'éviter des brûlures, maintenir un intervalle de 5 jours avant et après un traitement avec VegOil et un fongicide. 0,5-2 l/ha en adjonction aux herbicides pour augmentation du pouvoir mouillant et adhésif, maintien de l'efficacité.

Cultures maraîchères

0,5-2 l/ha en adjonction aux insecticides et herbicides pour augmentation du pouvoir mouillant et adhésif, maintien de l'efficacité.

Grandes cultures

0,5-5 l/ha en adjonction aux herbicides pour augmentation du pouvoir mouillant et adhésif, maintien de l'efficacité.

Betteraves sucrières

0,5-1 l/ha en adjonction aux herbicides lors de temps frais et si les betteraves ont déjà atteint 4 feuilles. Avec des températures au-dessus de 20 °C ne pas traiter.

Maïs

0,5-2 l/ha en adjonction à certains herbicides pour renforcer l'action foliaire sur adventices développées, mais pas par températures supérieures à 25 °C.

Arbustes d'ornement dans jardins familiaux (hors forêt)

2 % (30-40 l/ha) contre cochenilles lécanines; effet partiel: acariens, cheimatobies, pucerons du feuillage. Traitement au débourrement.

■ Mélange

Miscible avec Pyrethrum FS, Spintor

■ Conservation et stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments et ne doit pas être accessible aux personnes non autorisées.

■ Élimination

Ne pas laisser pénétrer les restes de produit dans les égouts. Les restes de produit doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Nettoyer soigneusement les emballages vides et éliminer avec l'enlèvement des ordures.

■ Premiers secours

Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise. Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau. Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières. Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin

■ Emballage

5 I

Détenteur d'homologation: Schneiter Agro AG, Industrie Birren 30, 5703 Seon